

**ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PLANI**

KOD: EN.PL.01

YAY. TAR.: 28.03.2018

REV. NO:00

REV. TARİHİ: 00

SAYFA NO: 1 / 11

ANTİBİYOTİK (JENERİK ADI)	ÜLKEMİZDEKİ PREPARATLAR	UYGULANIŞ YOLU	UYGULAMA
BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER			
A.PENİSİLİNLER			
1. DOĞAL PENİSİLİNLER			
Penisilin G kristalize	Kristapen, Kristasil, Penisilin G-Pots, Pensillina (İV form Liyofilize toz)	IV	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sulandırıldıktan sonra 250 ml Serum Fizyolojik içinde iki saat yavaş olarak infüzyon şeklinde verilir. Dektroz solüsyonu penisilin G potasyumu inhibe eder, kullanılmazlar. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz.
Penisilin G prokain	Benzapen-LA, Deposilin, Devapen, İecilline, Penadur,Pencain-K,Procilin, Prokain Penicilin (İM form Liyofilize toz)	İM	Derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Penisilin G benzatin	Benzapen-LA, Deposilin, Penadur-LA, Penadur 6.3.3., Pentin-LA (İM form Liyofilize toz)	İM	Derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Penisilin V (fenoksimetil penisilin)	Cliacil, Penoksil, Pen-Os	Oral	Yemeklerden bir saat önce alınmalıdır.
2. PENİSİLİNAZA DİRENÇLİ PENİSİLİNLER			
Metisilin	Yok		
Oksasilin	Yok		
Kloksasilin	Yok		
Dikloksasilin	Yok		
Flukloksasilin	Yok		
3. AMİNOPENİSİLİNLER			

YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ

ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PLANI

Ampisilin	Alfasilin, Ampisina, Azosilin, Makrosilin, Negopen, Neosilin, Penbisin, Seskasilin, Silina (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, İM, Oral	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir. Oral preparatlar yemeklerden 1 saat önce verilmelidir.
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PLANI**

KOD: EN.PL.01

YAY. TAR.: 28.03.2018

REV. TAR.:

REV. NO: 00

SAYFA NO: 2 / 11

ANTİBİYOTİK (JENERİK ADI)	ÜLKEMİZDEKİ PREPARATLAR	UYGULANIŞ YOLU	UYGULAMA
Amoksisilin	Alfoxil, Amoksilin, Amoksina, Amosin, Amoxicil, Atoksilin, Demoksil, Largopen, Moksilin, Remoxil, Topramoxin, Trimosin (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM, Oral	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir. Oral preparatlar yemeklerden 1 saat önce verilmelidir.
Bakampisilin	Bakamsilin, Penbak	Oral	Yemek zamanına bakılmaksızın verilebilir.
4. ÜREİDOPENİSİLİNLER			
Azlosilin	Yok		
Mezlosilin	Yok		
Piperasilin	Pipraks (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
5. KARBOKSİPENİSİLİNLER			
İndanilkarbenisilin	Yok		
Karbenisilin	Yok		
Tikarsilin	Yok		
6. BETALAKTAMAZ İNHİBİTÖRLÜLER			
Ampisilin/Sulbaktam	Alfasid, Ampisid, Combicid, Duobak, Duobaktam, Duocid, Nobecid, Sulbaksit, Sulcid, Sultamat, Sultasid, Sultibac (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM, Oral	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Kendi çözeltisi ile sulandırıldıktan sonra oda ısısında 8 saat, buzdolabında 48 saat saklanabilir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir. Oral preparatların emilimi iyi değildir.
Amoksisilin/Klavulonat	Amoklavın, Amoksilav, Augmentin, Bioment, Croxilex, Klamoks, Klavunat, Klavupen (İV form Liyofilize toz)	IV, Oral	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. Oral yemeklerin başlangıcında verilmelidir, çiğnmeden yutulur.
Tikarsilin/Klavulonat	Yok		

**ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PLANI****KOD: EN.PL.01****YAY. TAR.: 28.03.2018****REV. TAR.:****REV. NO: 00****SAYFA NO: 3 / 11**

ANTİBİYOTİK (JENERİK ADI)	ÜLKEMİZDEKİ PREPARATLAR	UYGULANIŞ YOLU	UYGULAMA
Piperasilin/Tazobaktam	Tazocin (İV/İM form Liyofilize toz)	IV	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz.
B. SEFALOSPORİNLER			
1. BİRİNCİ KUŞAK SEFALOSPORİNLER			
Sefazolin	Cefamezin, Cefozin, Cezol, Eqizolin, İespor, Maksiporin, Sefamax, Sefazol (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Kendi çözeltisi ile sulandırıldıktan sonra oda ısısında 24 saat saklanabilir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Sefazolin	Cefamezin, Cefozin, Cezol, Eqizolin, İespor, Maksiporin, Sefamax, Sefazol (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Kendi çözeltisi ile sulandırıldıktan sonra oda ısısında 24 saat saklanabilir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Sefalotin	Yok		
Sefadroksil	Cefradur, Duricef	Oral	Yemeklerle birlikte verilir.
Sefaleksil	Maksipor, Sef	Oral	Yemeklerle birlikte verilir.
Sefradin	Yok		
2. İKİNCİ KUŞAK SEFALOSPORİNLER			
Sefoksitin	Yok		
Sefuroksim Sodyum	Aksef, Multisef, Zinnat (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Sefaklor	Ceclor, Kefsid, Losefar	Oral	Yemekler ile birlikte verilir.
Sefuroksim aksetil	Aksef, Cefaks, Cefatin, Enfexia, Oraceftin, Sefaktil, Sefuroks, Zinnat	Oral	Yemekten sonra verilir, çiğnmeden yutulmalıdır.
Sefprozil	Serozil	Oral	Yemeklerle birlikte verilir.
Lorakarbef	Lorabid	Oral	Yemeklerden bir saat önce verilir.

**ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PLANI****KOD: EN.PL.01****YAY. TAR.: 28.03.2018****REV. TAR.:****REV. NO: 00****SAYFA NO: 4 / 11**

ANTİBİYOTİK (JENERİK ADI)	ÜLKEMİZDEKİ PREPARATLAR	UYGULANIŞ YOLU	UYGULAMA
3. ÜÇÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİNLER			
Sefiksım	Suprax, Zimaks	Oral	Yemeklerden sonra verilir.
Sefotaksim	Betaksim, Claforan, Deforan, Doksetil, Sefagen, Sefoksım, Sefotak, Taxocef (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Kendi çözeltisi ile sulandırıldıktan sonra oda ısısında 24 saat saklanabilir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Seftizoksım	Cefizox (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Kendi çözeltisi ile sulandırıldıktan sonra oda ısısında 24 saat saklanabilir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Seftriakson	Baktisef, Cefaday, Cephaxon, Desefin, Eqiceft, Forsef, İsef, Nevakson, Novosef, Rocephin, Triaxon, Unacefin (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Sefoperazon	Cefobid (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Kendi çözeltisi ile sulandırıldıktan sonra oda ısısında 24 saat saklanabilir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Seftazidim	Fortum, İsetum (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Moksalaktam	Yok		

**ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PLANI****KOD: EN.PL.01****YAY. TAR.: 04.01.2016****REV. TAR.:****REV. NO: 00****SAYFA NO: 5 / 11**

ANTİBİYOTİK (JENERİK ADI)	ÜLKEMİZDEKİ PREPARATLAR	UYGULANIŞ YOLU	UYGULAMA
4. DÖRDÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİNLER			
Sefepim	Maxipime, Unisef (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, İM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Kendi çözeltisi ile sulandırıldıktan sonra oda ısısında 24 saat saklanabilir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
5. BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLÜLER			
Sefoperazon/Sulbaktam	Sulperazon (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, İM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Piperasilin/Tazobaktam	Tazocin (İV form Liyofilize toz)	IV	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz.
C. MONOBAKTAMLAR			
Aztreonam	Azactam	İV, İM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
D. KARBAPENEMLER			
İmipenem	Tienam (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, İM	120 ml'lim Tienam toz infüzyon şişeleri 100 ml serum fizyolojik ile sulandırılmalı ve berrak bir solüsyon elde edilene kadar çalkalanmalı ve 30-60 dk içinde infüzyon şeklinde verilmelidir. Sulandırma için Laktatlı Ringer kullanılmaz. Sulandırıldıktan sonra oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24 saat saklanabilir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.

**ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PLANI**

KOD: EN.PL.01

YAY. TAR.: 04.01.2016

REV. TAR.:

REV. NO: 00

SAYFA NO: 6 / 11

ANTİBİYOTİK (JENERİK ADI)	ÜLKEMİZDEKİ PREPARATLAR	UYGULANIŞ YOLU	UYGULAMA
Meropenem	Meronem (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
GLİKOPEPTİDLER			
Vankomisin	Vancomycin-DBL, Vancorin, Vankomisin (İV form Liyofilize toz)	IV	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak en az 60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz.
Teikoplanin	Targocid (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, IM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra buzdolabında 24 saat saklanabilir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
AMİNOGLİKOZİDLER			
Streptomisin	Strep-Deva, Streptomycin-İE (İM form Liyofilize toz)	IM	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Kanamisin	Yok		
Gentamisin	Genmisin, Genta, Gentamed, Genthaver, Gentreks, Getamisin (İV/İM form ampul)	IV, IM	50-100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
Tobramisin	Tobel (İV/İM form ampul)	IV, IM	Gentamisinin verildiği şekilde.
Netilmisin	Netromycine (İV/İM form ampul)	IV, IM	Gentamisinin verildiği şekilde.
Amikasin	Amikaver, Amiketem, Amiklin, Amikozit, Mikasin (İV/İM form ampul)	IV, IM	Gentamisinin verildiği şekilde.
İsepamisin	İsepacine (İV/İM form ampul)	IV, IM	Gentamisinin verildiği şekilde.
MAKROLİDLER			
A. 14 ÜYELİLER			
Eritromisin	Erimicin, Eritro, Eritrosif, Erythrocin	Oral	Aç veya yemeklerden hemen önce çiğnmeden verilir.
Roksitromisin	Remora, Ritosin, Roksimin, Roksolit, Rulid	Oral	Yemeklerden hemen önce çiğnmeden verilir.

**ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PLANI****KOD: EN.PL.01****YAY. TAR.: 04.01.2016****REV. TAR.:****REV. NO: 00****SAYFA NO: 7 / 11**

ANTİBİYOTİK (JENERİK ADI)	ÜLKEMİZDEKİ PREPARATLAR	UYGULANIŞ YOLU	UYGULAMA
Klaritromisin	Claricide, Deklarit, Klacid, Klarolid, Klaromin, Klax, Laricid, Macrol, Megasid, Uniklar (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, Oral	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra oda ısısında 24 saat, buzdolabında 48 saat saklanabilir. Oral, yemeklerle birlikte verilir.
Diritromisin	Dynabac	Oral	Yemeklerle birlikte verilir.
Fluritromisin	Yok		
B. 15 ÜYELİLER			
Azitromisin	Azacid, Azatek, Azeltin, Azitro, Azitrotek, Azomax, Azro, Tremac, Zitromax, Zitrotek	Oral	Yemeklerden en az 1 veya 2 saat önce verilmelidir.
C. 16 ÜYELİLER			
Spiramisin	Rovamycine	Oral	Yemeklerden hemen önce verilir.
Josamisin	Yok		
Midekamisin	Yok		
Rokitromisin	Yok		
Miokamisin	Yok		
KETOLİDLER			
Telitromisin	Ketek	Oral	Yemeklerle ilişkisi yoktur.
LİNZOLİDLER			
Klindamisin	Cleocin, Clin, Klindan, Klindaver, Klinoksin, Klitopsin, Lindhaver, Meneklin (İV/İM form ampul)	IV, IM, Oral	300 mg 50 ml, 600 mg 100 ml, 900 mg 150 ml, 1200 mg 200 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 15-45 dk infüzyon şeklinde verilir. Bir kerede 1200 mg aşan 1 saatlik infüzyon uygulanması önerilmemektedir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir. Oral, yemeklerle birlikte ve özefagus tahrişini önlemek için bol su ile verilir.
Linkomisin	Lincocin, Linkoles, Linkomed, Linkomisin-İE, Linkosol, Linosin (İV/İM form ampul)	IV, IM	50-100 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir.
STREPTOGRAMİNLER			
Kinopristin	Yok		
Dalfopristin	Yok		

**ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PLANI**

KOD: EN.PL.01

YAY. TAR.: 04.01.2016

REV. TAR.:

REV. NO: 00

SAYFA NO: 8 / 11

ANTİBİYOTİK (JENERİK ADI)	ÜLKEMİZDEKİ PREPARATLAR	UYGULANIŞ YOLU	UYGULAMA
OKSAZOLİDİNONLAR			
Linezolid	Yok		
Eperozolid	Yok		
TETRASİKİNLER			
A. KISA ETKİLİLER			
Klortetrasiklin	Yok		
Tetrasiklin	Tetra, Tetralet, Tetramin	Oral	Alüminyum, kalsiyum, magnezyum içeren ilaçlar ve sodyum bikarbonat ile birlikte kullanılmazlar. Yemeklerden 1 saat önce, özefagus tahrişini önlemek için bol su ile birlikte verilir.
Oksitetrasiklin	Yok		
B. ORTA ETKİLİLER			
Demeklosiklin	Yok		
Metasiklin	Yok		
C. UZUN ETKİLİLER			
Doksisiklin	Doksin, Monodoks, Tetrados	Oral	Alüminyum, kalsiyum, magnezyum içeren ilaçlar ve sodyum bikarbonat ile birlikte kullanılmazlar. Yemeklerden önce, özefagus tahrişini önlemek için bol su ile birlikte verilir.
Minosiklin	Yok		
SÜLFONAMİDLER/TRİMETOPRİM/TRİMETOPRİM-SÜLFAMETOKSAZOL			
A. KISA VE ORTA ETKİLİ OLANLAR			
Sülfisoksazol	Azo-Gantrisin	Oral	Yemeklerden önce verilir.
Sülfimetoksazol	Yok		
Trimetoprim/ Sulfametoksazol	Bactrim, Bakton, Bibakrim, Cotriver, Kemoprim, Metoprim, Septrin, Sulfaprim, Trifen, Trimoks (İV/İM form ampul)	IV, İM, Oral	Bir ampul 125 ml, 2 ampul 250 ml, 3 ampul 500 ml Serum Fizyolojik veya %5 Dekstroz içine katılarak 90 dakika içinde infüzyon şeklinde verilir. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir. Oral, yemeklerle birlikte verilir.
B. UZUN ETKİLİ OLANLAR			
Sülfadoksin	Yok		
C. GİS'TE SINIRLI ETKİDE BULUNANLAR			
Sülfaguanidin	Yok		

**ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PLANI**

KOD: EN.PL.01

YAY. TAR.: 04.01.2016

REV. TAR.:

REV. NO: 00

SAYFA NO: 9 / 11

ANTİBİYOTİK (JENERİK ADI)	ÜLKEMİZDEKİ PREPARATLAR	UYGULANIŞ YOLU	UYGULAMA
Sülfasüksidin	Yok		
Sülfatalidin	Yok		
KLORAMFENİKOL VE TİAMFENİKOL			
Kloramfenikol	Kemicetine, Klorasüksinat (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, İM, Oral	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir. Oral, yemeklerden önce verilir.
Tiamfenikol	Tiofen, Urfamycin (İV/İM form Liyofilize toz)	IV, İM, Oral	Önce birlikte verilen enjeksiyonluk su ile sulandırılır. Sonra 100 ml Serum Fizyolojik içine katılarak 30-60 dk infüzyon şeklinde verilir. Sulandırıldıktan sonra saklanmaz. İM, derin enjeksiyon ile yavaş olarak verilir. Oral, yemeklerden önce verilir.
NİTROFURANTOİNLER			
Nitrofurantoin	Piyeloseptyl, Uriseptin	Oral	Yemek arasında verilir.
KİNOLONLAR			
Ofloksasin	Drovid, Exocin, Girasid, Kozoksin, Menefloks, Ofkozoin, Oflocide, Ofloks, Tarivid, Urosin (Enfüzyon çözeltisi)	IV, Oral	Hazır infüzyon form 30 dakika içinde verilmelidir. Enfüzyon flakonları açıldıktan sonra zaman geçirilmeden kullanılmalıdır. Oral, aç karına veya yemeklerle birlikte çiğnenmeden verilir.
Siprofloksasin	Ciflosin, Ciprasid, Cipro, Ciproktan, Ciprolon, Ciproxin, Flosiprin, Loxasid, Proxacin, Roflazin, Roxin, Sanset, Sifloks, Siprobek, Siprosan, Sispres, ÜroCiproxin (Enfüzyon çözeltisi)	IV, Oral	Hazır infüzyon form 30-60 dakika içinde verilmelidir. Enfüzyon flakonları açıldıktan sonra zaman geçirilmeden kullanılmalıdır. Oral, aç karına veya yemeklerle birlikte çiğnenmeden verilir.
Pefloksasin	Peflacine (IV form ampul)	IV, Oral	Bir ampul 250 ml %5 Dekstroz solüsyonu içinde çözülür. Serum fizyolojik veya klorür içeren solüsyonlar içinde çözülmemelidir. 60 dk içinde infüze edilir. Oral, yemeklerle birlikte verilir.
Norfloksasin	Noroxin	Oral	Yemeklerle birlikte verilir.
Enoksasin	Enoksetin	Oral	Yemeklerden önce verilir.
Levofloksasin	Cravit, Tavanic (Enfüzyon çözeltisi)	IV, Oral	Hazır infüzyon form 30-60 dakika içinde verilmelidir. Enfüzyon flakonları açıldıktan sonra zaman geçirilmeden kullanılmalıdır. Oral, aç karına veya yemeklerle birlikte çiğnenmeden verilir.

**ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PLANI****KOD: EN.PL.01****YAY. TAR.: 04.01.2016****REV. TAR.:****REV. NO: 00****SAYFA NO: 10 / 11**

ANTİBİYOTİK (JENERİK ADI)	ÜLKEMİZDEKİ PREPARATLAR	UYGULANIŞ YOLU	UYGULAMA
Moksifloksasin	Avelox (Enfüzyon çözeltisi)	IV, Oral	Hazır infüzyon form 30-60 dakika içinde verilmelidir. Enfüzyon flakonları açıldıktan sonra zaman geçirilmeden kullanılmalıdır. Oral, aç karına veya yemeklerle birlikte çiğnenmeden verilir.
RİFAMPİSİN			
Rifampisin	Rifadin, Rifcap, Rifex	Oral	Yemeklerden 1 saat önce aç karına verilir.
NİTROİMİDAZOLLER			
Metronidazol	Flagyl, Metrajil, Metrazol, Metronidazol, Metronidazole, Nidazol (IV form perfüzyon solüsyonu)	IV, Oral	Hazır solüsyon 30-60 dk verilir. Oral, yemeklerle birlikte verilir.
Ornidazol	Biteral, Borneral, Ornidone, Ornisid, Ornitop (IV form ampul)	IV, Oral	Bir ampul 100 ml serum fizyolojik veya %5 dekstroz içine katılır. 15-30 dk enfüzyon olarak verilir. Oral, daima yemeklerden sonra verilir.
Seknidazol	Flagentyl	Oral	Yemeklerden sonra verilir.
Tinidazol	Fasigyn	Oral	Yemeklerden önce verilir.
FUSİDİK ASİT			
Fusidik asit	Stafine	Oral	Yemeklerle birlikte verilir.
ANTİVİRALLER			
Amantadin	Yok		
Rimantadin	Yok		
Zanamivir	Relenza	Oral inhalasyon	Yemeklerden önce verilir.
Oseltamivir	Tamiflu	Oral	Yemeklerden önce verilir.
Ribavirin	Copegus, Rebetol	Oral	Yemeklerden önce verilir.
Gansiklovir	Cymevene	IV	İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanına danışarak kullanılır.
Valgansiklovir	Yok		
Asiklovir	Acyl, Aklovir, Asiviral, Hemovir, Klovireks-L, Provir, Silovir, Virosil, Zovirax (IV form liyofilize toz)	IV, Oral	Önce 10 ml serum fizyolojik ile sulandırılarak çözülür. Ardından 250-500 mg arasındaki dozlar için 100 ml, 500-1000 mg arasındaki dozlar için ikinci bir 100 ml serum fizyolojik içinde enfüzyon şeklinde verilir (sulandırıldıktan sonra 5 mg/ml'den daha yüksek asiklovir konsantrasyonu olmamalıdır). Oral, yemeklerden sonra verilir.
Famsiklovir	Famvir	Oral	Yemeklerle ilişkisi yok.

**ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PLANI****KOD: EN.PL.01****YAY. TAR.: 04.01.2016****REV. TAR.:****REV. NO: 00****SAYFA NO: 11 / 11**

ANTİBİYOTİK (JENERİK ADI)	ÜLKEMİZDEKİ PREPARATLAR	UYGULANIŞ YOLU	UYGULAMA
Valasiklovir	Valtrex	Oral	Yemeklerle ilişkisi yok.
Vidarabin	Yok		
İdoksüridin	Yok		
Trifluridin	Yok		
Sorivudin	Yok		
Sidofovir	Yok		
Lamivudin	Epivir, Zeffix	Oral	Yemeklerden önce verilir.
Foskarnet	Yok		
İnterferonlar	İntron-A, Roferon-A, Pegasys, Pegintron	İM, SC	İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanına danışarak kullanılır.
SİSTEMİK ETKİLİ ANTİFUNGALLER			
Amfoterisin B	Abelcet, Ambisome, Amphocil, Fungizone	IV	İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanına danışarak kullanılır.
Flukonazol	Candidin, Flucan, Flurit, Fluzole, Fungan, Kandizol, Lumen, Triflucan, Trizol, Zolax (Enfüzyon çözeltisi)	IV, Oral	Hazır infüzyon form 30-60 dakika içinde verilmelidir. Enfüzyon flakonları açıldıktan sonra zaman geçirilmeden kullanılmalıdır. Oral, aç karına veya yemeklerle birlikte çiğnenmeden verilir.
İtrakonazol	Funit, İtraspor, Sporex		Yemeklerden sonra tok karına verilmelidir.
Vorikonazol	Vfend	IV, Oral	İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanına danışarak kullanılır.
Ekinokandin	Cancidas	IV	10 ml dekstroz içermeyen diğer sıvılar ile (serum fizyolojik gibi) sulandırılmalı ve berrak bir solüsyon elde edilene kadar çalkalanmalı ve 60 dk içinde infüzyon şeklinde verilmelidir. Sulandırıldıktan sonra buzdolabında 48 saat, 250C altında 24 saat stabil.